

Předjaří 2009

**ZAHRADNICKÉ
CENTRUM**

Zpravodaj

zdarma

radý a informace pro naše zákazníky



Chybí vám pestré barvy a už máte dost ponuré lednové šedi? Zajděte si do nejbližšího zahradnického centra a vyberte si ze široké nabídky řezaných tulipánů.

Tulipány pocházejí z Číny, odkud se rozšířily do Turecka, Iránu, severní Afriky a jiných zemí. Tyto cibuloviny začaly být oceňovány jako zahradní rostliny v 15. a 16. století v Turecku v zahradách sultánů. V Evropě se první tulipány objevily v císařské botanické zahradě ve Vídni, odkud se koncem 16. století dostaly do Nizozemska, které se zejména díky vhodným klimatickým a půdním podmínkám stalo tulipánovou velmocí.

Jaro začíná s tulipány



V dnešní době se kromě tulipánů pěstovaných v okrasných zahradách nabízejí tulipány i jako řezané květiny, které se pěstují ve skleníkových podmínkách. Řezané tulipány lze koupit celoročně, ale jejich hlavní sezona začíná v lednu a trvá do konce dubna. Tulipán při pokojové teplotě vydrží pěkný 7 až 12 dní, záleží na odrůdě a následné péči. Vybíráme si vždy tulipány s dostatečně vyvinutým poupětem a svěžími listy. Před umístěním do vázy seřízneme ostrým nožem stonky a seříznutí dvakrát týdně opakujeme. Stejně často vyměňujeme vodu ve váze a přidáváme výživu pro řezané květiny. Pokud jsou tulipány po cestě povadlé, je vhodné je umístit do vázy zabalené, stonky pak zůstanou rovné. Tulipány umístíme na místo chráněné před sluncem a průvanem. V místnostech s nižší teplotou vydrží tulipány až 14 dní. Zajímavé je, že se délka stonků i květů postupně prodlužuje a tulipány rostou. Tulipány vyniknou ve skleněné váze samostatně i v kombinaci s jinými květy nebo zelení. Nejjednodušším způsobem je naaranžovat tulipány volně do skleněné vázy. Pěkná je kombinace z tulipánů a různých větviček – vzniká kontrast mezi hrubým vzhledem větví a jemnou krásou

tulipánů. Při aranžování tulipánů do kytic počítejme s tím, že stonky ve váze ještě povyroستou, proto se do míchaných kytic vkládají o něco hlouběji než ostatní květy. Do velkých kytic jsou vhodné francouzské tulipány, jejichž stonky může být dlouhý až 60 cm. Tulipány působí pěkně i v kyticích s jinými jarními rostlinami

jako jsou například frézie, pryskyřníky, kalina, kosatec a jiné, případně lze ladit pouze do jedné barvy, třeba červené ke svátku svatého Valentýna.

Jan Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov





Oblečení do květin

Pokud patříte k těm, kteří se po dlouhé zimě nemohou dočkat jara, máme pro vás několik nápadů, jak se přiblížit květinám doslova na dotek a vytvořit z nich doplňky dámského i pánského šatníku.



Spolu se svými přáteli jsem připravila několik květinových doplňků, které se hodí pro ozdobení šatů a vlasů k různým společenským příležitostem, večírkům, plesům a podobně. Aranžmá by měla být volena vždy tak, aby bylo už na první pohled jasné, že muž a žena tvoří pár; pro pány je proto ideálním doplňkem například květinová kravata vytvořená ze stejných rostlin a ve stejném stylu jako šaty jeho protějšku.

Pro svůj první model jsem zvolila doplňky z tulipánů oranžové barvy (odrůda Prinses Irene), dále jsem použila červené sasanky (odrůda Marianne Red) a listy aspidistry. Druhý model byl tvořen z růžové gypsophily a tmavých zantedeschii



(odrůda Schwarzwaller), základem pro kravatu byly aspidistrové listy. Doplňky do vlasů byly tvořeny červenými toulitkami (odrůda Tropical), růžovými květy cymbidií, bílými chryzantémami a zelenými drobnokvětými



chryzantémami (odrůda Froggy). Bílé chryzantémy se moc líbily naší psí slečně Bonie, která mi po celou dobu tvoření pomáhala tím, že stěhovala moje pomůcky do svého



pelíšku. Pochopila jsem, že bych na ni neměla zapomenout, a proto se i Bonie stala modelem, nebo spíše modelkou. Z počátku se jí květinový obojek moc nezamlouval, ale posuďte sami, výborně jí jde k pleti...

Bezpochyby nejvhodnější příležitostí pro ozdobení šatů a vlasů květinami, je svatba, proto jsme pro vás do příštího vydání

Zpravodaje připravili několik námětů svatebních dekorací. Ať už si květinové doplňky na své šaty či vlasy vytvoříte sami, nebo si přijdete pro pomoc do našich zahradnických center, určitě budete originální a okouzlující.

Jana Veselá
Chládek –
zahradnické
centrum



PREMIUM PRODUCT
FLORIA

pěstování pro radost ♥

Zářivá svěžest



**Professional
Quality**
+antistatický
účinek

- VYNIKÁ VYSOKÝM LESKEM
- ZABRAŇUJE VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH VÁPENNÝCH SKVRN
- PŮSOBÍ ANTISTATICKY

Stěny z okrasných dřevin

Hledáte-li pohledovou ochranu, která na zahradě nezabere mnoho místa a přitom je originálním a nevšedním prvkem zahradní architektury, zkuste se inspirovat v zemi tulipánů.

Pravděpodobně jste si toho na výletě do Nizozemí všimli: v mnoha oknech chybí záclony. Pro tento holandský zvyk existuje několik vysvětlení, a nikdo už nejspíš neví, které je pravdivé. První tvrdí, že zakrývání oken záclonami kdysi zakázali angličtí okupanti, kteří chtěli mít jistotu, že se proti nim v šeru za závěsem

nechystá spiknutí. Jiní zase soudí, že protestantští obyvatelé domů tak dávali najevo svou skromnost, počestnost a zbožnost: každý kolemjdoucí mohl nahlédnout a ujistit se, že v téhle domácnosti se žije, jak víra vyžaduje. Pan farář prý občas dělal kontrolní obchůzky...

Stromy místo záclon

Během staletí si Holanďané zvykli na pohledy z ulice a zároveň se naučili, jak se chránit před dotěrnými paprsky slunce: namísto rolet používají stromy.

Předzahrádky nebo chodník lemují dokonale střižené koruny, často vedené po vodorovných oporách. Vzniká tak špalír, který vrhá měkký stín, chrání před hlukem a prachem ulice a navíc vydechuje životodárný kyslík. Bývá z listnatých stromů, takže v zimě, kdy je světla nedostatek, propustí do oken dostatek slunečních paprsků.

Toto řešení vám také pomůže „ošidit“ přírodu. Můžete totiž vysadit oblíbený vzrůstný strom, který byste ve volném tvaru a konečné velikosti v zahradě nikdy mít nemohli, protože by vás mohl ze zahrady „vystěhovat“.

Při výběru je třeba brát ohled na druh stromu a typ olistění. Nejde jen o krásu, ale také o to, zda chcete dosáhnout pouze optického a pocitového odstínění (pak zvolte platan, ambroň či morušu), nebo odclonění plného (to zajistí lípa nebo habr).

Plot i pergola

Toto elegantní a účelné řešení se může uplatnit i v zemi, kde sousedská kontrola není právě vítána. Pohledová ochrana a přirozené stínění z dřevin na špalírech má dvě nezanedbatelné výhody: zabere



málo místa a dobře vypadá. Přijde tedy vhod, když potřebujete odclonit úzkou předzahrádku, sousední zahradu ve čtvrti řadových domků anebo zakrýt nevzhlednou kůlnu. Dobře střižená „listnatá“ stěna se totiž spokojí i s pásem záhonu širokým necelý metr. Na zajímavosti jí dodává volba dřevin. V zahradnických centrech bývá k dispozici například ambroň (*Liquidambar*), platan javorolistý (*Platanus hispanica*), moruše (*Morus*), lípa (*Tilia*), habr (*Carpinus*) nebo okrasné jabloně (*Malus*). Živá stěna se tak během roku proměňuje: období květů vystřídá hustá clona z listů, které se později vybarví do zlatých tónů, a často mezi nimi zazáří i dekorativní (nebo i jedlé) plody. Malé koruny příliš nestíní, a tak je pod stromy ideální místo pro podsadbu. Chcete-li zachovat holandský styl i v detailech, podsadte stromy jednodruhovým záhonem vysokým 60–80 cm. Nejvhodnější jsou stálezelené

nižších keřů nebo travin. Také v tomto případě dbejte na to, aby podsadba zůstala olistěná i v zimním období. Existuje ještě jedno atraktivní využití stromů zapěstovaných na konstrukci: mohou zastřešit zahradní posezení. Koruna vedená po vodorovných kruhových oporách totiž vytvoří živý „slunečník“. Zakryjete-li zem kolem stromu dlažbou (kolem kmene však nechte volný kruh alespoň o metrovém průměru), můžete si ušetřit stavbu pergoly. Zelená střecha ji za slunných letních dnů dokonale zastoupí.

Pravidelná údržba

Na tvarované ploty a špalíry se zásadně používají rychle rostoucí druhy dřevin, které zajistí dostatečnou tvorbu zelené hmoty a materiál pro jejich následné tvarování. Zelená stěna tudíž potřebuje každoroční řez. Stromy se prodávající už zapěstované na konstrukci, takže se



základním tvarováním si nemusíte dělat starosti.

V následujících letech je nutné koruny několikrát za rok upravovat: hlavní řez je nejlepší provést v zimě, když je koruna holá, další „doladění“ pak na začátku léta a případně v srpnu. Zpravidla se zkracují nebo odstraňují všechny svisle rostoucí výhony a ostatní se seřiznou tak, aby si koruna zachovala požadovaný tvar, případně se nové větve vyváží k základní konstrukci.

Při řezu vždy zkontrolujte upevnění větví k opoře, případně vyvažte mladé větve. Po několika letech od výsadby (zpravidla třech až pěti, podle péče a dosahovaných přírůstků) můžete nosnou konstrukci ze stromu odstranit.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

nebo poloopadavé rostliny na živé ploty, jako zimozelen (*Buxus*), bobkovišeň (*Prunus laurocerasus*), habr (*Carpinus*) nebo buk (*Fagus*). V zimě, když jsou stromy ve špalíru opadané, dají vaší kompozici pevnou optickou základnu. Zastáváte-li „českou cestu“, doporučujeme smíšený záhon z trvalek,





Ulmus glabra 'Pendula'

Řešení pro malé zahrady

Náš malý seriál o stromech vhodných do malých zahrádek se přiblížil ke svému závěru. Zbývá nám však ještě několik zástupců, kteří stojí za to, abychom jim věnovali svoji pozornost.

Někteří zástupci rodu **platanu** (*Platanus*) v dospělosti mohou pokrýt i malé náměstí, ale přesto se mezi nimi najdou dva kultivary, které si můžeme vysadit do malých zahrad. *Platanus x acerifolia* 'Alphen's Globe' má kulovitý tvar koruny o velikosti 4–5 m, *Platanus orientalis* 'Minaret' je větší, dorůstá 8–10 m. Podstatně více vhodných zástupců nám nabízí **slivoň** (*Prunus*). Z druhů s pravidelně kulovitými korunami jmenujme například *Prunus x eminensis* 'Umbraculifera' a *Prunus fruticosa* s průměrem koruny 3–5 m. Kvetou bíle a jsou velice atraktivní. *Prunus cerasifera* 'Nigra' je nápadná v době vegetace svým



Pyrus salicifolia 'Pendula'



Prunus 'Okame'

červeně zbarveným listem. Květ má růžový a dorůstá 6–8 m. Další růžově kvetoucí kultivar 'Okamé' doroste 3–5 m. *Prunus padus* 'Colorata', která má hroznovité růžové květenství, dorůstá výšky 3–5 m. Pokud máme na zahradě velice stísněné prostory, můžeme použít světle růžově kvetoucí *Prunus serrulata* 'Amanogawa', která má úzkou válcovitou korunu širokou asi metr a doroste do výšky 4–5 m. Pokud jsme omezeni výškou koruny, nabízí se plnokvětý růžový kultivar 'Kiku-Shidare' s převislou korunkou. Velikost rostliny je ovlivněna výškou roubování, které se pohybuje většinou v rozmezí 0,8–2 m. Šířka převislé korunky je většinou 3 m. Obdobné použití nabízí kultivar **hrušně** (*Pyrus*). *Pyrus salicifolia* 'Pendula' je zajímavá převislým tvarem korunky a hlavně stříbřitě šedivým vybarvením listů. Kvete bíle a dorůstá 5–6 m. **Akát** (*Robinia*) nabízí pro naše účely jeden kultivar *Robinia pseudoacacia* 'Umbraculifera' s kulovitou korunu dorůstající 5–6 m. Tento kultivar však nekvete.

Velice zajímavý kultivar z rodu **jerlín** (*Sophora*) je 'Pendula' s převislými, až k zemi splývajícími větvemi. Po letech dosáhne velikosti 4–5 m.

Jeřáb (*Sorbus*) se většinou do malých zahrad nehodí. Za zmínku stojí pouze kultivar 'Joseph Rock' se sloupovitým růstem vysoký až 8 m, který na podzim vybarvuje do červena a má bílé plody.



Prunus serrulata 'Amanogawa'
květ



Prunus serrulata 'Amanogawa'
podzimní vybarvení

Stejně dorůstá sloupovitý *Sorbus x thuringiaca* 'Fastigiata'.

Také mezi **lípami** (*Tilia*) najdeme kultivary vhodné do malého prostoru. *Tilia cordata* 'Lico' a 'Monto' mají v dospělosti průměr koruny pouze kolem tří metrů.

Z **jilmů** (*Ulmus*) lze do malých zahrad použít *Ulmus glabra* 'Pendula' s převislou korunou dorůstající 5–6 m. Zajímavý je hustě větvený *Ulmus minor* 'Jacquelin Hillieri' o průměru 3–4 m nebo 'Umbraculifera' s pravidelně kulovitou korunou dorůstající 4–5 m.

Jilmy uzavřely průřez sortimentem stromů, které se svou velikostí hodí do malých zahrad. Na závěr je třeba ještě upozornit na to, že uváděné velikosti stromů jsou orientační. Velký vliv na velikosti mají především podmínky, ve kterých rostlina roste, způsob, jak byla zapěstována ve školkařském podniku, tedy výška nasazení korunky a roubování, ale například také řez. Seriál měl napomoci jen k základní orientaci v sortimentu listnatých stromů.

Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r. o.



Sorbus 'Joseph Rock'



Prunus serrulata 'Kiku-Shidare'



Pyrus salicifolia 'Pendula'



Prunus cerasifera 'Nigra'



Robinia pseudoacacia
'Umbraculifera'

FISKARS®

FISKARS – NOVINKY

ROKU 2009



Finská společnost Fiskars uvádí na trh zahradnické nůžky s novým jedinečným mechanismem PowerStep™.

Kromě širokého sortimentu ergonomicky řešených zahradnických nůžek nabídne finská společnost Fiskars od února 2009 i nový zajímavý model s mechanismem PowerStep™. Zatímco s ostatními nůžkami musíte stříhnout větev na jeden ráz, technologie Fiskars PowerStep™ umožňuje zahradníkům přestříhnout větev v 1, 2 nebo 3 krocích. Nástroj automaticky vybere vhodnou možnost podle průměru stříhané větve.

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY FISKARS POWERSTEP™

1, 2 nebo 3... je to skutečně snadné

V případě tenkých větví, pracuje technologie PowerStep™ stejně jako běžné výkonné zahradnické nůžky a řez provede na jeden stisk držadel. V případě silnější větve však mechanismus PowerStep™ zvolí postupný stříh ve 2 nebo 3 krocích. Zahradnické nůžky Fiskars PowerStep™ snižují námahu. Lze je použít na větve do průměru 20 mm.

Při otevření čepelí se zobrazí na straně držadla číslice, která udává, kolik kroků je potřeba k provedení stříhu. Není nutné lámat si hlavu s výběrem nejlepšího postupu, nástroj to provede za vás, takže se můžete klidně soustředit na samotné zahradničení.



NŮŽKY NA SILNÉ VĚTVE FISKARS POWERSTEP™

Na podobném principu je také sestrojen mechanismus nůžek na silné větve PowerStep™, kterými lze snadno stříhat živé větve až do průměru 40 mm. Slabší větve stříhnou na jeden ráz. Na silnější větve se použijí dva, nebo tři stisky držadel k sobě. Tím se snižuje námaha. Jsou vhodné pro lidi s menší silou v rukách. Také tato novinka se objeví v únoru na našem trhu.



Zahradní výrobky Fiskars jsou vyráběny ve Finsku ze špičkových materiálů. Fiskars dává 5 let záruku na výrobní vady a vady materiálu. Na topůrka seker je záruka 10 let..

Další výrobky najdete na www.fiskars.com



NEZAPOMÍNEJME NA OCHRANU ROSTLIN ANI V DOBĚ, KDY SE ZAHRADA PROBOUZÍ ZE ZIMNÍHO SPÁNKU

Až se jaro zeptá...

Kadeřavost broskvoní je velice rozšířená choroba, proti níž se lze spolehlivě bránit pouze vhodnými fungicidními přípravky. Na mladých listech broskvoní vznikají zpočátku mírně vypouklé, žlutozelené, později červené puchýřovité skvrny, které se velmi rychle zvětšují, zduřují a tím deformují listy. Na spodních částech napadených listů se v květnu vytvářejí bělavé povlaky houby. Napadené listy opadávají a napadené stromy jsou nuceny vytvářet listy nové. Na plodech někdy vznikají červené skvrny s nepravidelným okrajem. Všechny letorosty silněji napadených stromů jsou nevyzrálé, s menší nasadou květních pupenů a náchylnější ke zmrznutí. Kromě broskvoní mohou být napadány i mandloně a broskvomandloně. Velmi důležitý je termín ošetření. Teoreticky je možné ošetřovat kdykoliv od opadu listů

na podzim do doby, kdy začínají rašit vrcholové pupeny. Prakticky se osvědčuje jedno ošetření před příchodem zimy a jedno nebo dvě ošetření v době rašení vrcholových pupenů. K postřiku se používají přípravky Delan 700 WDG, Champion 50 WP, Kuprikol 50 nebo Syllit 65.

Na ovocných dřevinách přezimuje řada důležitých **škůdců v různých vývojových fázích**. Jedná se především o vajíčka nejběžnějších druhů svilušek, mšic, mer a píďalek, vajíčka nebo larvy štítenek a puklic, housenky obalečů a podkopníčka spirálového a o motýly podkopníčka ovocného. Speciálním výrobkem pro tento účel je Jarní soupava obsahující insekticid Calypso 480 SC a smáčedlo Silwet. Složení této soupavy zabezpečuje dokonalý kontakt aplikační

kapaliny s celou plochou ošetřované kultury a tím se při stejném množství aplikační kapaliny dosáhne ošetření větší plochy.

Častým příkladem napadení okrasných rostlin uskladněných před mrazem v předjaří jsou **mšice**. Rostliny bychom měli ošetřit v době bez mrazů ve venkovním prostředí. Mšice jsou drobný savý hmyz, většinou zelené, žluté nebo černé barvy, které poškozují rostliny sáním. Poškozené listy žloutnou, červenají a různě se deformují. Nejčastěji jsou napadány nejmladší listy vegetační vrcholy. Nepřímo škodí přenosem řady virových chorob a tím, že na jimi vyloučené medovici, která se usazuje na povrchu rostlin (nejčastěji listů), se rozrůstají houbové „černě“ a tím se snižuje asimilační schopnost rostlin. S ochranou je třeba začít při prvním výskytu mšic nebo při prvních příznacích napadení. K ochraně je možné použít Mospilan 20 SP nebo Nurelle D.

Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.





Bioosiva

Pro ty z Vás, pro které je důležité žít v souladu s přírodou, jsme připravili nabídku bioosiv italské firmy Franchi Sementi. Toto bioosivo pochází z ekologického zemědělství, které kladе velký důraz na opatření chránící půdu a přírodu a nepoužívá syntetické pesticidy a umělá hnojiva. Díky osivu, které je pěstováno ekologickým způsobem, si můžete vypěstovat biozeleninu vynikajících chuťových vlastností s vysokou nutriční hodnotou a nezávadností pro Váš organismus.



Tykve

Velmi zajímavá řada tykví rozličných druhů a tvarů z celého světa. Můžete se těšit na překvapení na Vaší zahrádce, doma i v kuchyni.



Tráva pro domácí mazlíčky

Řada PICCOLI AMICI obsahuje pečlivě vybrané travní osivo, které je vhodné jako doplněk výživy pro Vaše domácí mazlíčky. Tráva obsahuje minerály, proteiny a další látky, které výrazně podporují trávení a zlepšují celkový zdravotní stav.

Klíčky a klíčidla

Řada GERMOGLI je možnost, jak získat čerstvou pochutinu s vysokou nutriční hodnotou všech potřebných živin (vitaminů, enzymů, minerálů), které jsou zároveň lehce stravitelné. To vše za minimum peněz. Konzumace klíčků - bioosiv má regenerační i terapeutické účinky. Nové klíčky (budoucí mladé rostlinky) získáme vysetím osiva do klíčidla (klíčící misky). Klíčící miska Vám umožní vypěstovat si vlastní klíčky - biopotravinu v klidu a pohodě domácího krbu.

Správná péče o kamélie

Kamélie patří mezi choulostivé rostliny zejména v době, kdy má nasazená poupata. Rostliny s poupaty pěstujeme v teplotě 8–10 °C. Květy se sice budou vyvíjet pomaleji, zato však jistě. Prodlouží se tak



i doba kvetení. Nejhorší pro kamélii s poupaty jsou velké výkyvy teplot a nízká vzdušná vlhkost. Velké škody také způsobí úplné vyschnutí substrátu. Pokud již k tomu dojde, ponořte celý květník do nádoby s vodou, tak aby substrát měl možnost přijmout větší množství vody.


Kontrola uskladněných hlíz

Hlízy rostlin jako jsou jiřinky, mečíky nebo begonie musíme přes zimu skladovat na suchém místě. Napadne-li hlízy plíseň, musíme poškozené kusy vyřadit a zlikvidovat. Plíseň se velmi rychle šíří a brzy by napadla všechny ostatní hlízy. Následné je důležité skladovací prostor dobře vyvětrat a nadále udržovat nízkou vzdušnou vlhkost.



Moniliová hniloba

Monilióza napadá plody všech druhů jaderovin a peckovin. Na napadených plodech vytváří terčovitý obrazec. Později se plody cvrknuou a zůstávají viset na stromech i přes zimu. V těchto mumifikovaných plodech zůstává velké



množství spor, které na jaře napomáhají rozšíření této nebezpečné choroby. Proto je dobré všechny napadené plody posbírat a zlikvidovat.

Rychlené hyacinty

Pokud bychom volili nejvoňavější rostlinu jara, určitě by naši soutěž vyhrál hyacint. Předností hyacintů je kromě delikátní vůně, krásného tvaru květenství i jednotlivých květů jejich barevná paleta. Tradičnější obal, například proutěný košíček nebo váza s barokním nádechem, dodá hyacintu hrdý, téměř královský vzhled, který je ideální pro klasičtější či rustikálnější zařízení interiéru. Hyacint, náležitě ozdobený, se může stát hezkým dárkem k svátku či narozeninám lidem narozeným na konci zimy a začátku jara.



FOTO HKK

Sníh na zahradě

V přírodě sníh působí jako přirozená izolace. Sněhová pokrývka pomáhá rostlinám překonat velké mrazy a tající sníh zase dodává i v zimě potřebnou vláhu kořenům stálezelených rostlin. Sníh odstraněný z chodníků a cestiček v zahradě lze bez obav přiklidit například k živému plotu nebo k jehličnatým dřevinám. Problém nastává, když je sněhu opravdu hodně a nebo napadne sníh mokrý a těžký. Pod tíhou sněhu hrozí rostlinám rozklesnutí nebo dokonce zlomení větví. Náchylné jsou především sloupovité jehličnany jako jalovce nebo zeravy (túje). Takovému poškození zamezíme buď včasným smetením sněhu nebo tím, že rostlinu ovážeme provázkem. Větvě jsou tak zpevněny a nerozklesnou se.



Připravil Jan Chládek
Chládek – zahradnické centrum

Orchideje jsou velmi zajímavou a rozsáhlou skupinou rostlin. V krátkém seriálu se budeme zabývat druhy, jejichž původní vlasti jsou tropy a subtropy. Jsou to přesně ty květiny, jejichž sběr byl často cílem dobrodružných výprav do asijských a jihoamerických pralesů. Oč jednodušší to má dnešní obdivovatel těchto květin – stačí, když navštíví nejbližší zahradnické centrum.

Můry, které potěší



K nejprodávanějším orchidejím patří bezesporu můrovník – *Phalaenopsis*. Trvanlivost květů tohoto druhu je naprosto mimořádná (vydrží až několik měsíců) a při minimální péči ochotně nasazuje další květní stvoly.

Rostliny pocházejí z nižších pater deštného pralesa, kde rostou v korunách stromů pomocí silných vzdušných kořenů. Je zde vlhko, dostatek rozptýleného světla a teplota nad 25 °C. Zahradní kultivary snesou i nižší teploty kolem 16 °C, nesnášejí však přímé slunce a přemokření. Nejsou náročné na živiny, přihnojujeme v malých dávkách, ne častěji než je uváděno na speciálních přípravcích pro orchideje. Rostliny můžeme rosit, nikoliv však na květy. Z květináče vyrůstající kořeny nejsou žádným signálem pro přesazování rostlin. Vytváření vzdušných kořenů je znakem toho, že rostlina prosperuje. Rostliny přesazujeme pouze tehdy, pokud nadzemní část, listy a květní stvoly natolik zbytní, že malý květináč se substrátem neumožní rostlinu fixovat.

Přesazujeme do květináče jen o málo většího, nejlépe průhledného, aby kořeny mohly růst na světle. Místo substrátu zvolíme hrubou piniovou kůru určenou speciálně pro orchideje. Běžně dostupný rašelinový substrát pro orchideje je pro tento druh nevhodný!

Zaléváme nejlépe dešťovou vodou jednou týdně tak, že prolijeme substrát a asi po půlhodině odstraníme vodu z misky. Přemokření nebo trvale vodou naplněná podmiska je nejčastější příčinou neúspěchu.

Odkvetlý stvol stačí pouze zakrátit po nejbližší očko, z něho se obvykle vyvine nový, i když ne tak silný kvetoucí výhon. Tento postup lze několikrát opakovat, až nakonec stvol odřežeme úplně dole, někde v paždí listové růžice. Je-li rostlina v kondici, brzy se dočkáme vyrašení nového stvolu a kvetení pokračuje.

Phalaenopsis standardně nabízíme v květináčích o průměru 9 až 12 cm tříděné do různých cenových kategorií podle počtu květních stvolů a počtu květů. Nejlevnější jsou rostliny s jedním květním stvolem a několika vyvinutými poupaty, které můžeme vidat v obchodech pod heslem "orchideje již od 180 Kč" a podobně. Pokud ale nutně musíme kupovat rostliny jednotlivé, pak doporučuji volit alespoň stvoly s alespoň devíti poupaty. Jejich cena se pohybuje kolem 300 Kč, tedy stále méně než větší řezaná kytice.

Dražší jsou drobnokvěté, silně větvené odrůdy označované jako "multiflora" s velkým počtem květů a mimořádně dlouhou životností květenství. Rostliny z této skupiny pořídíme za cenu mezi 400 až 600 Kč.

Připlatit je nutné i za neobvyklou, méně rozšířenou barvu, za květy se zajímavou kresbou, případně za odrůdu s mimořádně velkými květy. Pokud však zůstaneme u rostlin se dvěma stvoly a s květináčem o průměru do 15 cm, cena by se měla pohybovat kolem 700 Kč.

Orchideje druhu *Phalaenopsis* nabízené v našich zahradnických centrech jsou k nám dováženy z holandských květinových burz. Jejich pěstitelé používají stále dokonalejší technologické postupy při pěstování a stále šlechtí nové odrůdy, které se liší nejen barvou květu, ale i odolností. Nová technologie pěstování ovlivňuje příznivě cenu a nově vyšlechtěné odrůdy se liší od původních botanických druhů nejen barvou a velikostí květů, ale také snadnějším pěstováním v domácích podmínkách, které často nejsou optimální. V případě můrovníku tedy nic nebrání tomu, aby se tato rostlina stala i u nás jednou z nejčastěji prodávaných kvetoucích pokojových rostlin.

RNDr. František Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov

Foto Holandská květinová kancelář a archiv



pěstování pro radost ♥

Něžná krása orchidejí



• SPECIÁLNÍ VZDUŠNÝ
SUBSTRÁT

• VYROBEN
Z PINIOVÉ KŮRY

• DEKORATIVNÍ
VZHLED



novinka

Nebezpečné krásky

Každý prostor bez živé zeleně působí smutně a jednotvárně. Rostliny vnášejí do každého místa v bytě život, vytvářejí jeho atmosféru a jsou víc než jeho ozdobou. Zlepšují klima a zároveň vybízejí k činnosti, která může přispět k pohodě a uvolnění. Málokdo si však uvědomí, že i pokojové rostliny nás mohou ohrozit.

Podobně nebezpečnou čeledí jsou i amarylkovité. Nejjedovatější částí rostlin této čeledi jsou jejich cibule,

Zní to poněkud dramaticky, ale pokud máme dostatek informací o rostlinách a správně s nimi zacházíme, můžeme se vyhnout nejruznějším rizikům. Některé pokojové rostliny obsahují látky, které vyvolávají u lidí nebo také u domácích zvířat alergické reakce nebo příznaky otravy. A to nejen když je ochutnáme, ale také při přesazování nebo při kontaktu s pokožkou.

Jedovatými druhy se vyznačují zvláště některé čeledi. Téměř všechny druhy

čeledi lilkovitých jsou jedovaté. Patří sem například okrasný lilek (*Solanum*), jehož plody obsahují alkaloid solanin, který se nachází i v nezralých rajčatech nebo nazelenalých hlízách brambor. Po požití okrasných plodů se objevuje nevolnost, bolesti břicha a nespavost.

Primula obconica



Clivia



Codiaeum



Crinum

jedovatá je ale celá rostlina. Mezi běžně pěstované druhy pokojových rostlin patří hvězdník (*Hippeastrum*), klívie (*Clivia*) či křín (*Crinum*). Čeleď aronovitých je trochu exotická: patří sem například pokojová a svatební květina kala nebo toulitka.

Z pokojových rostlin ozdobných listem zná každý monstera (*Monstera*), filodendron (*Philodendron*) a difenbachie (*Dieffenbachia*); šťáva z jejich listů vyvolává alergické vyrážky. Některé druhy z této čeledi obsahují ve svých pletivech nerozpustné krystaly šťavelanu vápenatého ve tvaru jehliček (rafidů), které při pozření mechanicky dráždí sliznici dutiny ústní a trávicího traktu. Výsledkem je svědění, otoky a záněty jazyka, patra a hltanu, což se může projevit potížími při dýchání až dušením. Z prýscovitých pokojových rostlin je jedovatý například krotón (*Codiaeum*) nebo pryšec nádherný (*Poinsettia pulcherrima*) známý jako vánoční hvězda. Rostliny z této čeledi obsahují latex, jehož složky mají dráždivé účinky na kůži a sliznici trávicího traktu. Po potřísnění kůže vyvolává kontaktní alergie a kožní ekzémy. Poslední čeledí, o které se zmíníme, jsou prvosenkovité. Sem patří i několik druhů pokojových primulek, například prvosenka nálevkovitá (*Primula obconica*). V chloupkách pokožky jejich listů je obsažen alkaloid primin, který může u citlivých lidí vyvolat alergická kožní



Dieffenbachia



Monstera

onemocnění. Zahradní prvosenky odolné vůči chladu alergii způsobující primin neobsahují. Pokojové květiny mají v našem životě své nezastupitelné místo a je celkem pravděpodobné, že doma některou z jedovatých rostlin máme. V domácnostech s malými dětmi a zvířaty by měly být umístěny na méně dostupných místech – vysoko na skříní, polici nebo v závěsném

květináči. Do dětského pokoje tyto rostliny rozhodně nepatří. Více informací o pokojových rostlinách můžete získat na informačních kioscích v našich prodejnách nebo na internetu na stránkách SZC případně u našich prodávaců, kteří vám rádi poradí.


Ing. Jiří Brabec
Zahradnické centrum Brabec



Letničky a Balkónové rostliny - Pokojové rostliny - Popínávé rostliny - Travní směsi

Katalog-rostlin.cz

www.katalog-rostlin.cz




V poslední době prošel katalog rostlin několika rozšířeními, a proto bychom Vás s nimi rádi seznámili. Snažíme se Vám touto cestou usnadnit vyhledání rostlin v našem katalogu a doplňovat postupně veškeré rostliny z nabízeného sortimentu.

KATALOG OBSAHUJE			
Letničky a balkónové rostliny	58 rostlin	Pokojové rostliny	139 rostlin
Popínávé rostliny	30 rostlin	Travní směsi	9 směsí



Ke stávajícím kategoriím rostlin (pokojové rostliny, letničky a balkónové rostliny) přibýly **popínávé rostliny a travní směsi**.

Na úvodní stránce přibyl seznam druhů rostlin, které katalog obsahuje. Po kliknutí na danou skupinu přejdete přímo do požadované sekce.



V sekcích *výsledek vyhledávání*, *abecední seznam* a v *jednotlivých druzích rostlin* přibýly ovládací prvky, jimiž lze vyhledávané nebo zobrazované rostliny řadit abecedně vzestupně nebo sestupně dle latinského nebo českého názvu rostliny. Dále přibyla možnost změny zobrazení seznamu rostlin. Stávající zobrazení rostlin s obrázky je v sekcích rozšířeno o zobrazení rostlin ve jmenném seznamu bez obrázků.



Jiří Chládek ml.

Hosté z Ameriky

TOULITKA (ANTHURIUM)

Toulitky pocházejí z tropických pralesů Střední a Jižní Ameriky, kde jich roste na 500 druhů. V nabídce našich zahradnických center však nejčastěji nalezneme hybridy *Anthurium scherzerianum*, které nejsou tak náročné na péči a zvládneme je pěstovat i doma.

Toulitky patří mezi velmi dekorativní pokojové rostliny. Mají trsy tmavě zelených kožovitých, lesklých listů srdčitého tvaru na dlouhých řapících a palicovité květenství, které nese oválný toulec u původních rostlin červené barvy, u kultivarů vzniklých křížením však může být bílý, růžový, zelenobílý i skvrnitý.

Vzhledem k svému původu vyžaduje toulitka sice dostatek světla, ale rozhodně ne přímé slunce. Dostatek světla je důležitý i v zimním období. Další podmínkou pro úspěšné pěstování je vyšší vlhkost jak substrátu, tak i vzduchu. Substrát by neměl nikdy vyschnout. Vzdušnou vlhkost zajistíme častým rosením listů, nikoliv květů. Pro zajištění stálé vlhkosti můžeme rostlinu umístit na misku s vodou naplněnou kamínky či keramzitem. Voda pro zálivku by neměla být příliš tvrdá a teplota vody by měla odpovídat teplotě vzduchu. Přiměřená teplota pro pěstování je v létě 20–27 °C, v zimě 18–22 °C ve dne a 16–18 °C v noci. Nikdy by neměla klesnout pod 15 °C.

Rostliny přesazujeme obvykle po dvou letech. Protože kořeny potřebují hodně vzduchu, používáme vzdušné rašelinné substráty nejlépe s příměsí perlitu s pH mezi 5 až 5,5. Přihnojujeme od března do srpna jednou za dva týdny. Nedostatečná výživa způsobuje útlum růstu nových listů a rostlina nekvete. S každým novým listem se totiž tvoří i základ nového květenství. Květy se objevují od jara do podzimu a květenství vydrží i několik týdnů.

Starší rostliny lze rozmnožit rozdělením trsů. Pokusit se můžeme i o výsev zralých semen. Je nutné je vysít ihned po sklizni, protože brzy ztrácejí klíčivost.



KALATEA (CALATHEA)

Tato pokojová rostlina se pěstuje především pro krásu svých pestrých listů. Pochází z tropických deštných pralesů Střední a Jižní Ameriky, kde roste jako keřové patro ve stínu vysokých stromů, proto vyžaduje i při pěstování v našich domovech trvalé stínění a vyšší vzdušnou vlhkost. Teplota v létě by se měla pohybovat mezi 20 a 25 °C (ale ne přes 30 °C), v zimě minimálně 18–20 °C. Pro zálivku a vzdušnou vlhkost platí totéž co u toulitky. Samozřejmostí je zálivka měkkou vodou, substrát by neměl nikdy vyschnout. Při nedostatku vlhkosti se listy svinují.

Kalateu přihnojujeme jako běžné pokojové nekvetoucí rostliny během vegetace dvakrát za měsíc, v období klidu stačí jednou za měsíc. Rostlinu přesazujeme vždy, když je

květináč naplněn kořeny. Substrát by měl být rašelínový, humózní, lehký. Zároveň se můžeme pokusit o množení rozdělením rostliny. Musíme ovšem postupovat velmi opatrně, abychom nepoškodili jemné kořeny.

V našich zahradnických centrech můžete mimo jiné koupit tyto druhy:

C. crocata – kvete krásnými oranžovými květy ve tvaru růžiček. Vytváří husté kompaktní rostliny s listy 10 cm dlouhými. Čepel listu je na svrchní straně tmavě zelená, spodní strana je nachově červená. Pro nasazení na květ je třeba teplota 17–21 °C a krátký den.

C. lancifolia (syn. *C. insignis*) – má řapíkaté, protáhle až 45 cm dlouhé listy, které jsou na okraji zvlněné. Podobně

jako předchozí druh má vínovou spodní stranu listu. Kresba na svrchní straně čepele listu se vyznačuje podlouhlými načervenalými skvrnami se světle zeleným podkladem.

C. makoyana – středně vzrůstný druh s vejčitými, tupě zašpičatělými listy. Světle zelená čepel má podél středního nervu tmavě zelené, protáhle oválné skvrny.

C. rufibarba – husté kompaktní keře s protáhlými listy na okraji zvlněnými, čepel je panašovaná.

Ing. Marie Sýkorová

Fišer zahradnické centrum

Foto Nederlandse Anthurium Vereniging
a Holandská květinová kancelář




Novinek plné sáčky

Pokud na své zahradě rádi pěstujete nejen osvědčené druhy okrasných a užitkových rostlin, ale občas si zkusíte zasít i některou z novinek, máme pro vás několik tipů pro nadcházející zahradnickou sezonu.

Kelozel

Kříženec zelí a kapusty (*Brassica oleracea* convar. *capitata* x convar. *sabauda*) se na našem trhu objevuje poprvé. Tvoří velké hlávky s jemně bublinatým listem. Vnitřní struktura je pevnější než u kapusty, vyznačuje se ale vyšší křehkostí a jemností než zelí. Doporučujeme výsev v dubnu přímo na záhon do hnízd 60 x 50 cm nebo výsadbu předpěstované sadby z březnových až dubnových výsevů. Kelozel můžete přes zimu ponechat na záhoně – podle dosavadních zkušeností nevymrzá.

PETROSA F1 (bílá) tvoří velké kulaté hlávky s mírně bublinatými listy. Vegetační doba je 80 dní, hlávky jsou středně skladovatelné (říjen – prosinec). COLORSA F1 (červená) má vnější listy zelené s červeným žháním, mírně bublinaté, pro podzimní sklizeň, vegetační doba 85 – 90 dní.



Šalotka ze semene

Šalotka je zeleninou pro skutečné labužníky. Její harmonická chuť je trochu

ztrpčena složitým pěstováním (množí se převážně vegetativně) a pracným čištěním a zpracováním. Řešením je odrůda AMBITION F1, která se množí semenem! Pěstujeme ji podobně jako cibuli, z jarních výsevů nám do pozdního léta vyrostou středně velké cibule šalotky, které nejsou děleny do drobnějších cibulek. Slupka této odrůdy je žlutá,



dužnaté suknice na řezu rovněž bělavě nažloutlé. Cibule této odrůdy jsou výborně skladovatelné, bez větších nároků vám vydrží až do jara. AMBITION F1 není odrůdou typické šalotky – množilkou. Neefektivnější je její pěstování ze semen. Nesnažte se pěstovat ji druhým rokem z drobnějších cibulek, narostly by vám sice cibule větší, ale rovněž nedělené.

Pažitka ERECTA

ERECTA je raná, vysoce výnosná odrůda se vzpřímenou pevnou natí. Má pevné, tmavě zelené listy s jemným pažitkovým aroma. Chuť je vyvážená, jemná, není příliš palčivá ani ostrá, hodí se i do



pomazánek určených na "společenský večírek".

Květy pažitky, které většinou odstraňujeme, jsou rovněž jedlé. Můžeme jimi ozdobit saláty, nebo je mírně podusit na čínu.

Stévie sladká

Vegetativně množené rostliny tohoto přírodního nekalorického sladidla jsou již několik let i na českém trhu.

Letošní novinkou jsou semena stévie! Stévie sladká (*Stevia rebaudiana*)



je tropická trvalka, která se u nás pěstuje jako letnička. Rostlina v našich podmínkách dorůstá až 70 cm, má bohaté olistění a drobné bílé kvítky. Je vysoce náročná na teplo s optimem nad 25 °C. Nejlépe se jí daří ve skleníku, dá se ale letnit nebo vysadit na slunný záhon v teplejší lokalitě. Při teplotě pod 10 °C rostlina zastavuje růst. Drobná semena stévie vyséváme v únoru nebo březnu ve skleníku. Když jsou semenáčky dost velké k uchopení, přepikýrujeme je do květináčků. Ven umísťujeme až koncem května, kdy nehrozí výrazné noční poklesy teplot. Zaštípnutí rostliny podpoří její větvení. Sklízíme mladé části výhonů a využíváme za čerstva nebo sušíme. Stévie je ceněna hlavně jako nekalorické sladidlo. Glycosid steviosid je 300krát sladší než sacharóza a pětikrát sladší než sacharin. Je stálý při zahřívání, nemění pH ani nekvasí. Pro tyto vlastnosti jsou čerstvé i sušené listy stévie ceněny diabetiky. Rostlina ale rovněž zlepšuje trávení, má mírný antibakteriální účinek, zmírňuje únavový syndrom a dokonce snižuje touhu po tabáku a alkoholu.

Jahodník GRANDIAN F1

Nový velkoplodý hybrid jahodníku GRANDIAN F1 výrazně prodlužuje sezónu sklizně jahod. Opakovaně přináší velké, šťavnaté a dobře vybarvené plody od brzkého léta až do podzimu. Vynikají sladkostí a typickou jahodovou vůní i chutí. Odrůda GRANDIAN F1 se množí semenem. Semena vysévajte od ledna do konce března při pokojové teplotě 22 °C. Ve stadiu prvního pravého listu (po 4 – 6 týdnech) přepikýrujte. Dobře otužené sazenice můžete vysazovat na záhon v dubnu až červnu. Vyberte pro ně na zahradě plně osluněné místo s kvalitní,



dobře propustnou půdou. Zajistěte dostatek vody a občas odstraňte vyrůstající šlahouny.

Hvězdné tykvičky GALAXY OF STARS

GALAXY OF STARS – „galaxie hvězd“ je nejnovějším přírůstkem do hvězdné tykvičkové rodiny. Plody jsou jednoduché, pětiúhelníkové, zajímavé různobarevnou hvězdčovitou kresbou. Tato hybridní



odrůda vyniká vysokou úrodou a vyrovnaností plodů.

Nezanedbatelná je rovněž jejich velikost – určité by se neuplatnily v soutěži o největší tykev, právě průměr do 10 cm je ale předurčuje do košíků a ošatek na podzimní stůl.

Klipsy na roubování okurek a podnož SPRINTER F1

Roubování okurek je „zahrádkářskou maturitou“. Abychom ji zjednodušili a přiblížili i těm méně odvážným, máme letos novinku – klipsy na roubování okurek. Malé kolíčky s pružinkou zajistí jednoduché a současně dostatečně pevné spojení podnože a roubu. Odpadá pracné omotávání páskou a riziko, že se nám v průběhu obtáčení čerstvé řezné rány posunou a nedojde k srůstu. Využítí



klipsů má dvě podmínky. V prvních dnech srůstání je třeba zajistit teplotu kolem 20°C a hlavně 100% vzdušnou vlhkost. Zakryjte proto bedýnku s roubovanci fólií a neumísťujte ji na přímé slunce. Fólii můžete odstranit tehdy, když zaznamenate na roubu nový růst mladých listů. Novinkou je hybridní mezidruhovná podnož SPRINTER F1, vyšlechtěná speciálně pro účely roubování. Má tenčí lodyhu, vyšší afinitu (přijatelnost) s roubem a výborný zdravotní stav.

Astry RED RIBBON a BLUE RIBBON

Dvě letošní novinky mezi astrami – červená RED RIBBON a modrá BLUE RIBBON – dorůstají pouze 30 cm a jejich



primární určení je na záhon. Odrůdy ale větvi odspodu a dají se použít i k řezu do váz. Na první pohled zaujme jejich intenzivní červená a modrá barva s typickým bílým podbarvením. Při podrobnějším pohledu na soukvětí si všimněte, že každý korunní plátek, tedy správně jazykový květ, je po obou stranách bíle olemován.



Ing. Peter Gajdoštin
SEMO s.r.o. Smržice


... přemýšlíme za Vás !!!

* srozumitelný název * jednoduchá příprava * vysoká účinnost



chorobám a škůdcům **STOP**

insekticidy fungicidy herbicidy rodenticidy



... žádejte u svých prodejců !!!

 **AGRO CS**

Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
Tel.: 491 457 173, Fax: 491 453 145

www.agrocs.cz

Chládek – zahradnické centrum

Zahradnické centrum bylo založeno v roce 1992 na zrestituovaných pozemcích v Praze, na kterých kdysi bývalo pěstební zahradnictví prarodičů dnešních majitelů. Zahradnická tradice v rodině Chládkových sahá až do 19. století, jedná se tedy již o čtvrtou generaci zahradníků.


Původní prodejní skleník postavený v roce 1992 o rozloze 300 m² se velmi rychle ukázal jako nedostatečný, protože firma se rychle rozvíjela a bylo potřeba rozšiřovat sortiment. Od počátku ale bylo jasné, že hlavní síla zahradnického centra je v odborném prodeji veškerého rostlinného sortimentu. Zatímco rostlinám se dostává potřebné péče, zákazník má možnost při prodeji získat odborné informace a rady.

Během následujících let zahradnické centrum několikrát zvětšilo prodejní plochu a dokázalo si tak i mezi rostoucí konkurencí pražských supermarketů se zahradnickým sortimentem udržet své renomé a hlavně své zákazníky, kteří se rádi vracejí. Tajemstvím úspěchu je mnoho dní, měsíců a let tvrdé práce, která ale přináší hodně radosti, protože největším úspěchem firmy se stal spokojený zákazník. Lidé si sem nepřicházejí jenom nakoupit, ale také načerpat nápady, jak zvelebit svou zahradu či byt, mají možnost si nakoupit bytové doplňky a dekorace nebo se jen procházet a čerpat příjemnou atmosféru. Málokdo ale odchází skutečně s prázdnou, mnohem častěji je slyšet

věta: "Přišli jsem se k vám jenom podívat a už zase máme plný košík věcí..."

V současné době stojí Chládek – zahradnické centrum před svým největším rozšířením. Dokončili jsme výstavbu nových prostorných prodejních hal, které s příchodem jarní sezony zprovozníme. Pro větší pohodlí zákazníků se propojí vnitřní prodejna s venkovní plochou sloužící k prodeji okrasných dřevin, zprovozní se i malá restaurace s občerstvením a veškeré prodejní prostory se zvětší, takže budou pro zákazníka pohodlnější a příjemnější. Přijďte se podívat, jestli se nám náš záměr podařilo uskutečnit, rádi vás přivítáme!

POZVÁNKA
NA NÁVŠTĚVU



Sdružení zahradnických center

vás zve k návštěvě do svých prodejen



Chládek – zahradnické centrum

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN **www.dvorakasyn.cz**

- Stanová ulice
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
- areál zimního stadionu
Rudolická 1700
434 01 Most
Tel.: 476 100 794

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ CENTRUM

- www.zahradnicke-centrum.cz**
- Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293

FLORA GARDEN s.r.o. **www.floracz.cz**

- Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
- Hradecká ulice 1145
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942

ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE **www.zahradnictvilibeznice.cz**

- Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590



FIŠER ZAHRADNICKÉ CENTRUM spol. s r.o. **www.fiserzahradnictvi.cz**

- Lochotínská 42
301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
- Průmyslová 1276
334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453

FLORACENTRUM FERENČÍK **www.floracentrum.cz**

- Pražská ul.
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
- Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

BRABEC ZAHRADNICKÉ CENTRUM **www.brabeczc.cz**

- Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
Fax: 547 216 979

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ **www.zahradnictvisebrov.cz**

- Šebrov 189
679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
- Brněnská 154
666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
- Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

WWW.SZC.CZ